

Figura/foto cane
Logo e croce Bayer

Per uso veterinario

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Drontal plus flavour compresse per cani

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bayer S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Drontal plus flavour compresse per cani.

3. INDICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

Una compressa contiene:

Principi attivi:

Febantel	150,0 mg
Pirantel embonato (pirantel pamoato)	144,0 mg
Praziquantel	50,0 mg

4. INDICAZIONI

Antielmintico polivalente in compresse per cani, contro vermi tondi (ascaridi, ancilostomi, trichuridi) e tenie (compreso *Echinococcus spp.*)

Per la terapia antielmintica del cane; in particolare infestazioni da:

1. Ascaridi
 - *Toxocara canis*
 - *Toxascaris leonina*
2. Ancilostomi
 - *Ancylostoma caninum*
 - *Uncinaria stenocephala*

3. Trichuridi - *Trichuris vulpis*
4. Cestodi (vermi piatti) - *Dipylidium caninum*
- *Mesocestoides spp.*
- *Taenia ovis*
- *T. pisiformis*
- *T. hydatigena*
- *T. multiceps*
- *Echinococcus spp.* *

* *Echinococcus granulosus*

Il cane, portatore della tenia echinococco, si infesta tramite l'ovino, il bovino o il suino e può trasmettere anche all'uomo l'echinococcosi (idatidosi, forma cistica), grave malattia sociale delle regioni con allevamento ovino.

L'intervento terapeutico e/o profilattico con Drontal plus flavour compresse per cani (possibilmente programmato su vasta scala) interrompe il ciclo biologico del parassita ed evita la trasmissione all'uomo.

Distuggere le feci emesse nelle 24 ore successive al trattamento.

5. CONTROINDICAZIONI

Drontal plus flavour compresse per cani non è stato testato nella fase iniziale della gravidanza, pertanto non deve essere impiegato nei primi due terzi della gestazione.
Non usare in animali con ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Rari casi di disturbi gastrointestinali (vomito, anoressia, diarrea)

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Per cani.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

La dose consigliata è di 15 mg di febantel, 14,4 mg di pirantel embonato e 5 mg di praziquantel / kg di peso corporeo. Questo corrisponde a 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo.

Le 3 componenti febantel, pirantel e praziquantel sono dosate nelle compresse in modo ottimale, per cui la somministrazione U N I C A di

1 compressa ogni 10 kg-peso corporeo

libera il cane da tutti i vermi tondi e da tutte le tenie contemporaneamente.

Ad orientamento i dosaggi da rispettare secondo il peso del cane sono:

<u>Cuccioli e/o cani piccoli</u>	2 - 5 kg peso corporeo 5 - 10 kg peso corporeo	1/2 compressa 1 compressa
<u>Cani di media taglia</u>	11 - 20 kg peso corporeo 21 - 30 kg peso corporeo	2 compresse 3 compresse
<u>Cani di taglia Grossa</u>	31 - 40 kg peso corporeo	4 compresse ecc.

La compressa va somministrata al cane direttamente in bocca oppure avvolta nella carne, o frantumata nell'alimento.

Non è necessario rispettare particolari misure dietetiche: nè digiuno, nè purganti.

Una sola somministrazione è sufficiente per la completa sverminazione dei cani.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

-

10. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

La metà inutilizzata delle compresse non deve essere conservata.

11. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci.

Può svilupparsi resistenza da parassiti a qualsiasi particolare classe di antelmintici dopo un uso frequente e ripetuto di un antelmintico di quella classe.

Speciali precauzioni per l'impiego negli animali

Infestazione da ascaridi e anchilostomi:

In alcuni animali, i parassiti *Ancylostoma caninum* e *Toxocara canis* possono non essere completamente eliminati dal trattamento con conseguente continuo rischio di diffusione delle uova nell'ambiente. Si consigliano analisi di controllo delle feci e, in base ai risultati di questi esami, se necessario, si può procedere al trattamento con un prodotto nematocida.

Negli animali debilitati o gravemente infestati, il prodotto deve essere utilizzato solo previa valutazione del rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Le persone con nota ipersensibilità ai principi attivi contenuti in questo medicinale devono somministrare il prodotto con cautela.

Lavare le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di irritazione oculare, rivolgersi ad un medico. Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

Drontal plus flavour compresse per cani non è stato testato nella fase iniziale della gravidanza, pertanto non deve essere impiegato nei primi due terzi della gestazione.

In assenza di studi sulla specie di destinazione usare nell'ultimo periodo di gravidanza e durante l'allattamento solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Una dose di Drontal plus flavour compresse per cani pari a 10 volte quella consigliata è stata tollerata dai cani e dai cuccioli senza segni di danno.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

11/2012

14. ALTRE INFORMAZIONI

Proprietà farmacologiche

Nei frequenti casi di parassitosi miste della specie canina si rende necessaria la presenza nelle compresse delle 3 sostanze attive.

Sono stati scelti i principi attivi specifici per i più importanti generi di vermi, per cui si ottengono i risultati di più completa sverminazione con:

febantel.....in particolare contro i trichuridi,

pirantel..... in particolare contro gli ascaridi e gli ancilostomi,

praziquantel.....in particolare contro i cestodi (tenie).

Drontal plus flavour compresse per cani
Provvedimento n° 968 del 27.11.2012

Confezioni:

scatola da 2 compresse
scatola da 6 compresse
scatola da 24 compresse
scatola da 104 compresse

scatola da 2 compresse forma ad osso
scatola da 6 compresse forma ad osso
scatola da 24 compresse forma ad osso
scatola da 108 compresse forme ad osso

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.