



## Antipulci Collare Bolfo®, collare antiparassitario per cani

(Propoxur)

### NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

20156 Milano

Fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Germania

### DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Antipulci Collare Bolfo®, collare antiparassitario per cani.

Propoxur

### INDICAZIONE DELLA SOSTANZA ATTIVA E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 g di prodotto contengono:

Principio attivo:

Propoxur 9,87 g

### INDICAZIONI

Antiparassitario per uso esterno.

Collare antipulci per cani di piccola e grossa taglia.

Per il trattamento delle pulci e delle zecche nel cane.

Protegge per 4 mesi contro le pulci e per 2 mesi contro le zecche.

I parassiti che occasionalmente possono ancora attaccare l'animale, vengono velocemente eliminati dall'azione del collare.

### CONTROINDICAZIONI

Non usare su animali malati, convalescenti o debilitati.

Non utilizzare su animali con estese lesioni della pelle.

Non usare in cagne in allattamento.

Non usare in cuccioli al di sotto dei tre mesi d'età.

Non usare in caso di ipersensibilità accertate al propoxur o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

### REAZIONI AVVERSE

In rari casi, si possono verificare nel sito di applicazione irritazione, prurito, eritema e perdita del pelo, in particolare nei primi giorni successivi all'applicazione del collare.

In rarissimi casi gli animali possono manifestare agitazione e riduzione dei riflessi.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

### SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani.

### POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Un singolo collare per animale.

Il collare va applicato non troppo stretto in modo che fra esso e il collo dell'animale rimanga uno spazio di circa tre dita. La parte in eccedenza va invece tagliata e distrutta. Un collare troppo aderente può causare irritazioni della cute; in tal caso deve essere momentaneamente tolto.

Il collare va tolto inoltre in occasione del bagno del cane.

Se il collare si bagna accidentalmente, la sua azione riprende quando si asciuga.

Il collare Bolfo contiene la polvere micronizzata che si distribuisce rapidamente su tutto il corpo dell'animale e garantisce una protezione efficace contro pulci e zecche.

La polvere sul collare diventa dopo un po' di tempo invisibile, ma l'attività permane fino a 4 mesi.

79846290

LSD GmbH & Co. KG In der Steele 13 · 40599 Düsseldorf Tel.: 0211-7 48 49-0 · Fax: -410	<b>PM no.:</b> 79846290 <b>CR no.:</b> 007778 <b>Format:</b> 95 x 297 mm <b>Font size:</b> 9 pt <b>Drawing no.:</b>	Bayer Animal Health GmbH approved by BAH-PS-TO/PT <b>Technology</b> on ..... by .....	<b>In case of questions</b> phone: +49 2173 38... <b>Technology:</b> Thomas Fromm (VTFRT)..... 4702 Jörg Habig (TGHAJ)..... 5519 Uwe Müller (TGMUE)..... 4614 Otto Willinski (VTWIL)..... 4701	
	<b>Colours:</b> Schwarz Stanze	<b>Operator ID</b> AG	<b>Text + Layout</b> on ..... by .....	<b>Text + Presentation:</b> Christina Höfer (PHJNC)..... 4724 Rita Felicitas Reich (VTRER)..... 4098 Yvonne Sabatini (TGYVO)..... 4082 Renate Steinacker (VTSTE)..... 3046
		<b>Version no.:</b> 4		
		<b>Date:</b> 21.01.2010		

Con l'applicazione del collare i parassiti muoiono rapidamente. In caso di reinfestazione, in presenza del collare, i parassiti vengono comunque eliminati. Il collare Bolfo garantisce una protezione per 4 mesi contro le pulci e per 2 mesi contro le zecche. Assieme all'animale è consigliabile trattare anche l'ambiente con appositi prodotti antipulci ambientali.

**PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande e da recipienti destinati a contenerli. Conservare nella confezione originale. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

**AVVERTENZE SPECIALI**

**Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

E' necessario un controllo continuativo della integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza a contatto con l'animale. Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario.

Vedere sezioni Controindicazioni e Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione.

**Speciali precauzioni per l'impiego negli animali**

Nei primi giorni dell'uso, è opportuno controllare il collo del cane.

In caso di irritazione o di reazioni avverse togliere il collare.

Un collare troppo aderente può provocare irritazioni della cute. In tal caso deve essere momentaneamente tolto.

In animali altamente sensibili, si possono verificare irritazioni/prurito della pelle, in particolare nei primi giorni successivi all'applicazione del collare.

Vedere anche sezione Controindicazioni.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Dopo l'applicazione, o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Le persone con nota ipersensibilità alle sostanze contenute nel collare, devono evitare il contatto con il prodotto.

Tenere ben chiusa la confezione fino al momento dell'uso.

Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

**Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Studi di laboratorio non hanno evidenziato reazioni avverse. Non usare in cagne in allattamento.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Non superare le dosi consigliate.

A seguito di ingestione accidentale, possono verificarsi segni di intolleranza o di intossicazione come scialorrea, miosi, vomito o diarrea. In questi casi consultare immediatamente un medico veterinario per un trattamento sintomatico.

Antidoto: atropina solfato.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Giugno 2009

**ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni:

– Formato piccolo: 33 cm

– Formato grande: 66 cm

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.



LSD GmbH & Co. KG In der Steele 13 · 40599 Düsseldorf Tel.: 0211-7 48 49-0 · Fax: -410	<b>PM no.:</b> 79846290 <b>CR no.:</b> 007778 <b>Format:</b> 95 x 297 mm <b>Font size:</b> 9 pt <b>Drawing no.:</b>	Bayer Animal Health GmbH approved by BAH-PS-TO/PT <b>Technology</b> on ..... by .....	<b>In case of questions</b> phone: +49 2173 38... <b>Technology:</b> Thomas Fromm (VTFRT)..... 4702 Jörg Habig (TGHAJ)..... 5519 Uwe Müller (TGMUE)..... 4614 Otto Willnski (VTWIL)..... 4701	
	<b>Colours:</b> Schwarz Stanze	<b>Operator ID</b> AG	<b>Text + Layout</b> on ..... by .....	<b>Text + Presentation:</b> Christina Höfer (PHJNC)..... 4724 Rita Felicitas Reich (VTRER)..... 4098 Yvonne Sabatini (TGYVO)..... 4082 Renate Steinacker (VTSTE)..... 3046
		<b>Version no.:</b> 4		
		<b>Date:</b> 21.01.2010		
This proof is NOT a true representation of the final colours that will be printed.				