

ETICHETTA
flacone da 250 ml ovale
flacone da 250 ml angolare
tubo da 100 ml

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

BAYER S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Antipulci Shampoo Bolfo, 0,11 g/100 ml, shampo antiparassitario per cani

Propoxur

3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

100 ml di prodotto contengono:

Principio attivo:

Propoxur 0,11 g

4. INDICAZIONE(I)

Per uso esterno.

Shampoo antiparassitario per il trattamento delle pulci del cane.

5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su animali malati o convalescenti.

Non usare in cuccioli al di sotto dei tre mesi d'età.

Non usare in cagne in allattamento.

Non usare il prodotto su animali con estese lesioni della pelle.

Non usare in caso di ipersensibilità accertata al propoxur o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

In rarissimi casi possono manifestarsi episodi di vomito, diarrea, prurito, eritema, perdita di pelo, abbattimento e diminuzione dell'appetito.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8. FORMA FARMACEUTICA

Shampoo

9. CONFEZIONI

Flacone ovale da 250 ml

Flacone angolare da 250 ml

Tubo da 100 ml

10. POSOLOGIA, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Cani di piccola taglia (fino a 15 kg di peso): fino a 30 ml.

Cani di grossa taglia (oltre 15 fino a 25 kg di peso): fino a 50 ml.

Cani di taglia eccezionale (oltre 25 kg di peso) per es. S. Bernardo: fino a 100 ml.

- Bagnare bene tutto il corpo dell'animale con acqua tiepida.
- Indossando un paio di guanti, spalmare piccole quantità di shampoo (1 cucchiaino, pari a circa 10 ml di prodotto ogni 5 Kg di peso, corrispondente a 12,2 mg/Kg p.v.), su tutto il manto dell'animale in modo uniforme, massaggiando contropelo.
- Lasciare agire per 5-10 minuti, quindi risciacquare.

Non superare le dosi consigliate.

Il trattamento può essere ripetuto secondo necessità.

Assieme all'animale è consigliabile trattare anche l'ambiente con prodotti antipulci ambientali.

spazio per la posologia prescritta, ai sensi del D.Lvo 193/06, art. 58, comma 1, lettera f

Per ridurre la reinfestazione si raccomanda di trattare tutti i cani presenti nell'ambiente domestico. Si raccomanda inoltre l'uso di un idoneo trattamento ambientale contro le pulci adulte ed i loro stadi in via di sviluppo.

11. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessuna.

12. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande e dai recipienti destinati a contenerli.

Conservare lontano da fonti di calore, in un luogo fresco e asciutto.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

14. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Usare un paio di guanti protettivi per l'applicazione del prodotto.

Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Non ingerire ed evitare il contatto con la pelle.

Dopo l'applicazione e in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.

Le persone con nota ipersensibilità alle sostanze contenute nello shampoo devono evitare il contatto con il medicinale.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non sono riportate reazioni avverse in gravidanza. Non usare in cagne in allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Se ingerito, potrebbero aversi segni di intolleranza o intossicazione, come un'eccessiva salivazione, miosi, vomito o diarrea. In questi casi consultare immediatamente un medico veterinario.

Antidoto: atropina solfato.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

15. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

Il prodotto medicinale “Antipulci Shampoo Bolfo” non deve essere disperso nei corsi d’acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

16. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario (rosso).

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico veterinaria. (rosso)

17. DATA DI SCADENZA

Scad. (mese/anno)

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

18. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

19. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102988058 Flacone ovale da 250 ml
A.I.C. n. 102988060 Flacone angolare da 250 ml
A.I.C. n. 102988019 Tubo da 100 ml

20. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto (numero)

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA DELL’ULTIMA REVISIONE DEL TESTO

Marzo 2011

Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.

Euro ...

Esagono con simbolo materiale di condizionamento primario

Foto/Figura cane

Logo e croce Bayer

Pittogramma forma farmaceutica

Spazio per codice a lettura ottica 17/12/2007