

ZONA TIMBRATURA

Lotto n. Da consumarsi preferibilmente entro:




Stabigest®

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

Stabigest®

Mangime complementare liquido
per conigli di tutte le razze (conigli nani
e conigli in allevamento domestico) e per
piccoli mammiferi domestici (criceti, cavie,
cincillà, ecc.) in tutte le fasi di età.



Astuccio: PAP 21	Raccolta carta
Flacone: PET 1	Raccolta plastica
Misurino: PE02	Raccolta indifferenziata
Tappo: OTHER 7	Raccolta indifferenziata
Conferire in raccolta l'imballaggio vuoto. Prima dello smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune.	



STABIGEST

UFI: 8300-F0PQ-V00C-AH6W



INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA - In caso di consultazione di un
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta
del prodotto. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. -
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. -
Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti/indu-
menti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. - IN CASO
DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il
vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. - IN CASO
DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta
e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare
a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/un medico. - Conservare sotto chiave. -
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regola-
mentazione locale/regionale/nazionale.

CONTIENE: Acido Lattico, Acido propionico 15%, Acido
acetico 5%, Acido Formico 3%, Zinco solfato (mono-,
esa- e eptaidrato).


FORMEVET S.r.l. - Via Savona 97 - 20144 Milano (Italia)
Tel. + 39 02 4345891
www.formevet.com - vetline@formevet.it
Officina di produzione con numero di riconoscimento
aIT000539LO

200 ml

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

Stabigest®

Mangime complementare liquido
per conigli di tutte le razze (conigli nani
e conigli in allevamento domestico) e per
piccoli mammiferi domestici (criceti, cavie,
cincillà, ecc.) in tutte le fasi di età.



COMPOSIZIONE - Cloruro di potassio, Cloruro di sodio,
Saccarosio, Estratto di Propoli (0,1%), Maltodestrina.

ADDITIVI PER LITRO

Conservanti: 1a270/Acido lattico 280'000 mg -
1k280/Acido propionico 150'000 mg - 1a260/Acido
acetico 50'000 mg - 1k236/Acido formico 30'000 mg -
1a330/Acido citrico 25'000 mg - 1a297/Acido fumarico
5'000 mg.

Composti di oligoelementi: 3b605/Solfato di zinco
monoidrato 20'000 mg (Zn 7'280 mg) - 3b405/Solfato
di rame(II) pentaidrato 9'825 mg (Cu 2'500 mg).

Aromatizzanti: 2b16080/Acido tannico 1'050 mg.

COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI

Proteina grezza 0,9% - Fibra grezza 0,4%
Grassi grezzi 0,8% - Ceneri grezze 4,8%
Sodio 1,02% - Umidità 69,7%.

INDICAZIONI

Per la sua composizione comprendente una miscela di
6 acidi organici a catena corta e media, propoli, compo-
sti di oligoelementi, sali minerali ed un astringente (tan-
nino), STABIGEST è indicato per mantenere l'equilibrio
della microflora e del pH intestinale/ciecale, a salva-
guardia di una corretta digestione e del mantenimento di
condizioni che contrastano naturalmente l'insorgenza di
gonfiore addominale, meteorismo e di quel fenomeno
noto come "acqua in pancia" conseguente a situazioni di
stress quali errori alimentari, sovraffollamento, caldo
secco, freddo umido, ecc..

ISTRUZIONI PER L'USO E QUANTITÀ CONSIGLATE

Agitare il flacone prima dell'uso. Usando l'apposito mi-
surino, STABIGEST può essere somministrato, misce-
landolo accuratamente, nell'acqua da bere fresca e
pulita, in ragione di 3-4 ml per litro, o nel mangime, in
ragione di 6-8 ml per ogni chilogrammo. Si consiglia di
preparare l'acqua o il mangime giornalmente, sostituendo
il residuo.

Coniglie fattrici: 4-6 giorni di trattamento durante la 3°
settimana di gestazione.

Conigli in accrescimento: 4-6 giorni di trattamento dopo
lo svezzamento, da ripetersi ogni 3-4 settimane.

Conigli nani ed altri piccoli mammiferi domestici da affe-
zione (criceti, cavie, cincillà, ecc.): 4-6 giorni di tratta-
mento ogni 4-5 settimane. Conservare l'astuccio.

AVVERTENZE

L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è
controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una
quantità corrispondente o vicina al tenore massimo au-
torizzato. Il prodotto può rimuovere residui calcarei e/o
organici nei sistemi di abbeveraggio automatico.

D/0224