

NEPOREX[®] 2 WDG

Moschicida in granuli, solubile in acqua, per la lotta contro le larve di mosche

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'incenerimento autorizzato.

Composizione

Ciromazina pura 2 g

Coformulanti q.b.a 100 g

Caratteristiche tecniche

NEPOREX 2 WDG agisce unicamente sulle larve delle mosche uccidendole sia che si sviluppino nelle concimaie, nelle lettiere permanenti, negli accumuli delle deiezioni, come pure in tutti gli altri substrati o siti idonei allo sviluppo larvale delle mosche.

Modalità d'azione

NEPOEX 2 WDG interferisce sul ciclo biologico della mosca, provocando la morte delle larve. NEPOREX 2 WDG non agisce contro le mosche adulte, quindi deve essere applicato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione delle mosche stesse (quali ad esempio : letamaie, lettiere permanenti).

Modalità di impiego e dosi

Lo sviluppo delle larve di mosche avviene prevalentemente nelle lettiere lungo le pareti, i divisori e vicino a tutte le aree non calpestate dagli animali. Queste zone, di circa 50 cm di larghezza, devono essere trattate in maniera uniforme.

Vitelli allevati su lettiera permanente e box vitelli

Il primo trattamento deve essere effettuato 1-3 gg prima dell'arrivo degli animali o dopo la comparsa delle prime mosche in primavera. Ripetere il trattamento dopo 15 giorni, secondo necessità.

Per trattare 10 mq

Lettiere umide



250 g distribuiti tal quale

Lettiere asciutte



250 g diluiti
in 10 lt
di acqua



250 g diluiti
in 1-4 lt
di acqua

Bovini

Trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni.

Normalmente due trattamenti a distanza di 15 gg sono sufficienti

Per trattare 10 mq :



250 g distribuiti tal quale a spaglio

Evitare di utilizzare il prodotto diluito in acqua per non rendere scivoloso il pavimento

Suini

Trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni. Effettuare il primo trattamento in coincidenza del vuoto sanitario o dopo la comparsa delle prime mosche in primavera. Ripetere il trattamento dopo 15 giorni

Per trattare 10 mq



250 g diluiti in 10 lt
di acqua



250 g diluiti in 1-4 lt
di acqua

Polli

Trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni. Effettuare il primo trattamento quando lo spessore del letame è di 10 cm, ripetere il trattamento dopo 15 giorni o quando l'accumulo delle nuove deiezioni supera i 10 cm.

Per trattare 10 mq

Pollina umida



250 g distribuiti
tal quale

Pollina asciutta



250 g diluiti
in 10 lt di acqua



250 g diluiti
in 1-4 lt di acqua

Altri usi

Tutti i substrati idonei ad ospitare lo sviluppo larvale di mosche (discariche, scarti di lavorazione nelle industrie alimentari e della lavorazione delle pelli od altro materiale). Il primo trattamento deve essere effettuato distribuendo uniformemente il prodotto sopra il substrato da trattare. Ripetere i successivi interventi ogniqualvolta lo spessore del materiale superi i 10-15 cm. NEPOREX 2 WDG deve essere distribuito alla dose di 250 g ogni 10 mq di superficie da trattare.

Avvertenze

- Conservare in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non trattare mangimi. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Seguire le indicazioni fornite dal produttore
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso
- Effettuare il trattamento in assenza di animali. Subito dopo aver effettuato il trattamento delle superfici ed aerato gli ambienti, gli animali potranno essere riammessi nel loro habitat
- In caso di dispersione accidentale, per quanto possibile, raccogliere il prodotto e procedere al normale utilizzo; dopo aver raccolto il prodotto, lavare accuratamente ogni superficie ed oggetto con cui esso è venuto in contatto con acqua e sapone (od altro idoneo detergente)
- Usare guanti nella manipolazione. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone ed in caso di disturbi ricorrere al medico.

DA NON VENDERSI SFUSO

Presidio medico chirurgico

Registrazione n. 14566 del Ministero della Sanità

Elanco Europe Ltd. - Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, Regno Unito

Contenuto netto: 5 kg

Officina di produzione:

Lotto n° _____

Scade il _____