

II PREVENDOG 1.304 g collare medicato per cani di taglia grande

236968

NOME E ENDERÉZO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FÁBRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES:

Titular da autorização de introdução no mercado:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L. - Les Corts, 23 - 08028 - Barcelona - Spain

Produtor responsável pelo rilascio dei lotti di fabbricazione: AB7 SANTE - Chemin des Monges - 31450 Deyme - France

Distributore: VIRBAC SRL - Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano - Italia

DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO: PREVENDOG 1.304 g collare medicato per cani di taglia grande

Deltametrina

INDICAÇÃO(ES) (INDICAÇÕES): Infestação por parasitas sensíveis à deltametrina.

Princípio ativo: Deltametrina 1,304 g

Excipiente: Dióxido di titanio (E171) 0,465 g

Carbone attivo 0,024 g

Collare medicato grigio.

INDICAÇÃO(ES): Infestazioni parassitarie sensibili alla deltametrina. Prevenzione della reinfezione da zecche (*Ixodes ricinus* e *Rhipicephalus sanguineus*) attraverso un effetto acaricida per 6 mesi. Prevenzione delle punture di flebotomo (*Phlebotomus perniciosus*) a causa dell'effetto repellente (anti-feeding) per 12 mesi. Prevenzione delle punture di zanzara (*Culex pipiens*) a causa dell'effetto repellente (anti-feeding) per 6 mesi.

CONTRAINDICAÇÕES: In assenza di studi, non usare nei cuccioli di età inferiore a 7 settimane.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli excipienti.

Non usare nei gatti. Non usare in cani con lesioni cutanee.

REAÇÕES ADVERSAS: In rari casi, sono state osservate reazioni cutanee locali (prurito, eritema, perdita di pelo) che coinvolgono il collo o la cute in generale che potrebbero indicare una reazione di ipersensibilità locale o generale. In casi molto rari, è stato riportato anche un comportamento alterato (ad esempio letargia o iperattività) spesso associato a irritazione cutanea.

In rare occasioni, sono stati osservati sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea e ipersalivazione. In casi molto rari, sono stati osservati problemi neuromuscolari come atassia e tremore muscolare. I sintomi di solito scompaiono entro 48 ore dopo la rimozione del collare. Se si verifica uno di questi sintomi, il collare deve essere rimosso. Il trattamento deve essere sintomatico poiché non è noto alcun antidoto specifico.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)

- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)

- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)

- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)

- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

In alternativa, segnalare tramite il sistema nazionale di farmacovigilanza veterinaria


(http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P)

SPECIE DE DESTINAÇÃO: Cani (> 25 kg) per cani di taglia grande.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE: Un collare per cane.

Il collare lungo 75 cm deve essere usato su cani grandi. Si adatta al collo fino a 65 cm.

AVERTENZE PER UNA CORRETA SOMMINISTRAZIONE: Rimuovere il collare dalla confezione e rimuovere la striscia di sicurezza (peel-away). Regolare il collare attorno al collo dell'animale senza stringerlo troppo. Dovrebbero potersi inserire due dita tra il collare e il collo del cane. Far scorrere l'estremità attraverso la fibbia e tagliare la lunghezza in eccesso oltre i 5 cm.



Questo collare è stato progettato con un meccanismo di chiusura di sicurezza (sicurezza anti-strangolamento). Nell'improbabile eventualità che un cane sia intrappolato, la forza del cane è sufficiente per allargare il collare per consentire un rapido rilascio.

TEMPO(I) DI ATESA: Non pertinente.

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE: Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Tenere il sacchetto nell'imballaggio esterno.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta o sulla scatola dopo: SCAD::

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

AVERTENZA(E) SPECIALE(I):

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Poiché il collare esercita il suo pieno effetto dopo una settimana, il collare deve essere preferibilmente applicato 1 settimana prima che gli animali possano essere esposti all'infestazione. In rari casi si può verificare che delle zecche si attaccino mentre il collare è indossato. Le zecche saranno uccise e cadranno dall'ospite entro 24-48 ore dall'infestazione senza avere punto l'animale, ma non può essere escluso che singole zecche si attaccino dopo il trattamento. Pertanto, non è possibile escludere una trasmissione di malattie infettive da parte delle zecche. In condizioni sfavorevoli, la trasmissione di malattie infettive attraverso zecche o flebotomi non può quindi essere esclusa completamente.

Precauções especiais para l'impiego negli animais:

L'effetto dello shampoo sull'efficacia del prodotto non è stato testato.

Precauções especiais que devono essere adottate dalla persona que somministra o medicinale veterinario agli animais:

L'ingestione accidentale di questo prodotto può causare reazioni avverse, inclusi effetti neurotossici.

Conservare il prodotto nella confezione originale. Conservare il collare nella bustina fino al momento dell'uso.

Non fumare, bere o mangiare mentre si maneggia il collare. Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Non permettere ai bambini di giocare con il collare o di metterlo in bocca. Smaltire immediatamente eventuali residui o tagli del collare. Lavarsi le mani con acqua fredda dopo aver applicato il collare. Evitare il contatto prolungato con il collare o il cane che indossa il collare. Ciò include la condivisione di un letto con i cani che indossano il collare; questo è particolarmente importante per i bambini.

In caso di esposizione orale accidentale o ingestione, consultare un medico rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. La deltametrina può causare reazioni di ipersensibilità (allergiche) in persone sensibili.

Le persone con nota ipersensibilità alla deltametrina devono evitare il contatto con il medicinale veterinario e l'animale trattato.

Consultare un medico in caso di reazioni di ipersensibilità.

Altre precauções:

Sebbene il contatto occasionale con l'acqua non riduca l'efficacia del collare. Il principio attivo è dannoso per i pesci e altri organismi aquáticos. Ai cani deve essere impedito di nuotare in acqua per i primi cinque giorni di applicazione del collare.

Gravidanza e allattamento:

Gli studi di laboratorio condotti su ratti e conigli non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno. La sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza non è stata stabilita. L'uso non è raccomandato durante la gravidanza. Può essere usato durante l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Non usare con altri ectoparassitici (piretroidi o organofosfati).

Sovradosaggio (sintomas, procedure d'emergenza, antiodoti):

In caso di ingestione accidentale del collare da parte del cane, si possono osservare i seguenti sintomi di intossicazione: movimenti non coordinati, tremore, iperalimentazione, vomito, rigidità dei quarti posteriori. Questi sintomi di solito scompaiono entro 48 ore. In caso di ingestione accidentale il proprietario dell'animale deve contattare il veterinario e non deve iniziare un trattamento sintomatico, il veterinario dovrebbe valutare la necessità di qualsiasi trattamento sintomatico.

Incompatibilidade: Non pertinente.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI: Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO: 05/08/2021

ALTRE INFORMAZIONI:

Confezioni: Cartone o scatola metallica con una bustina contenente 1 collare da 75 cm.

Cartone o scatola metallica con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 75 cm.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

PT Prevendog 1,304 g coleira medicamentosa para cães grandes a muito grandes

NOME E ENDERÉZO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FÁBRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES:

Titular da autorização de introdução no mercado:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L. - Les Corts, 23 - 08028 - Barcelona - Espanha

Fabricante responsável pela libertação do lote:

AB7 SANTE - Chemin des Monges - 31450 Deyme - França

Distribuído por:

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA - R.do Centro Empresarial - Ed13-Piso 1- Esc.3 - Quinta da Beloura - 2710-693 Sintra - Portugal

NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO: Prevendog 1,304 g coleira medicamentosa para cães grandes a muito grandes

Deltametrina

DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S): Uma coleira de 75 cm (32,60 g) contém:

Substância(s) ativa(s): Deltametrina 1,304 g

Excipiente(s): Dióxido de titânio (E171) 0,465 g

Carvão ativado 0,024 g

Coleira medicamentosa cinzenta.

INDICAÇÃO (INDICAÇÕES): Infestação por parasitas sensíveis à deltametrina.

Prevenção de reinfeção por carraças (*Ixodes ricinus* e *Rhipicephalus sanguineus*) mediante um efeito acaricida durante 6 meses.

Prevenção de picadas por flebotomos (*Phlebotomus perniciosus*) devido a um efeito repellente (anti-alimentar) durante 12 meses.

CONTRAINDICAÇÕES: Na ausência de estudos, recomenda-se não utilizar em cachorros com menos de 7 semanas de idade.

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes.

Não utilizar em gatos. Não utilizar em cães com lesões cutâneas.

REAÇÕES ADVERSAS: Em casos raros, foram observadas reações cutâneas locais (prurido, eritema, queda do pelo) envolvendo a zona do pescoço ou a pele em geral, o que poderia ser indicativo de uma reação de hipersensibilidade local ou generalizada.

Em casos muito raros, foram ainda reportadas alterações comportamentais (por exemplo, letargia ou hiperatividade) frequentemente associadas a uma irritação cutânea. Em ocasiões muito raras, observaram-se sintomas gastrointestinais tais como vômitos, diarreia e hipersalivação. Muito raramente, observaram-se problemas neuromusculares tais como ataxia e tremores musculares.

Os sintomas são reversíveis, normalmente, nas 48h após a coleira ter sido retirada.

Caso ocorra qualquer um destes sintomas, a coleira deverá ser retirada. Uma vez que não existe um antídoto específico, o tratamento deverá ser sintomático.

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção:

- muito frequente (mais de 1 animal apresentando evento(s) adverso(s) em 10 animais tratados);

- frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados);

- pouco frequente (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1 000 animais tratados);

- rara (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10 000 animais tratados);

- muito rara (menos de 1 animal em 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas).

Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário.

Alternativamente pode notificar através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária (SNFV): farmacovigilancia.vet@dgv.pt.

ESPÉCIES-ALVO: Caninos (> 25 kg); para cães grandes a muito grandes.

DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Uma coleira por cada cão. A coleira com o comprimento de 75 cm destina-se a ser usada em cães grandes a muito grandes. Ajustável ao pescoço até 65 cm.

INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRETA: Retirar a coleira da embalagem e destacar a tira de proteção.

Ajustar a coleira à volta do pescoço do animal sem apertar demasiadamente. Deverá deixar uma folga de dois dedos entre a coleira e o pescoço do cão. Fazer deslizar a extremidade da coleira através da fivelha e cortar o excedente acima dos 5 cm de comprimento.

Esta coleira dispõe de um mecanismo de fecho de segurança (sistema de segurança anti-estrangulamento). No caso improvável de o cão ficar preso, a força do próprio animal não será suficiente para alargar a coleira de modo a soltá-la rapidamente.

INTERVALO(D) DE SEGURANÇA: Não aplicável.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Manter fora da vista e do alcance das crianças. Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer preca



GRAPHIC STUDIO
CREA

PRODUCT NAME :

PREVENDOG
COLLIER 75CM

COUNTRY : CY-ES-GR-IT-PT - VBI
PRODUCT CODE MASTER : 308550 - 308552

ITEM CODE VIRBAC : 84071604
ITEM CODE TP : 236968

GTD (DIELINE) :

(EN EXTERNE) Fiche du 22/11/18 par J.-P. LAUTHIER
DIMENSIONS A PLAT: 160MM X 680MM
DIMENSIONS PLIEE: 160MM X 35,5MM
PRIMEBRITE ULTRA 37g/M2
BLANC 120 PBR37W20
PLIAGE ET RAINAGE CENTRAL

COLORS
FRONT AND BACK
NOIR

ITEM : LEAFLET
SOFTWARE USED : INDESIGN CC 2021

TEXT SIZE : 8 PTS

COMMENTS :



TEST



TEMPLATE



TP PRINT FILE

FILE, MADE BY :
SC

VERSION DATE :
v1 - 02/02/2018
v2 - 15/02/2018

FILE, MADE BY :
SC + MU

VERSION DATE :
v1 - 02/02/2018
v2 - 16/02/2018

FILE, MADE BY :
M.UGOLINI

UPDATED BY :
VV
VV
CP
VV
CP

VERSION DATE :
v1 - 08/06/202

VERSION DATE :
v2 - 15/06/2021
v3 - 17/06/2021
v4 - 23/07/2021
v5 - 31/08/2021
v6 - 02/09/2021

APPROVED BY :
V.CRESTEIL

DATE :
DAR EU/2021

Approval signature :