

Indicazione del principio attivo e degli altri ingredienti

Ogni bomboletta contiene: **Principi attivi:** Amminosidina 0,50 g (presente come amminosidina solfato), Clostebol acetato 0,50 g, Prednisolone 0,10 g. **Propelente:** miscela dimetiletero-idrocarburi (Dymel A-Purifair ISO 32, 60:40) 50 g.

Forma farmaceutica - Spray cutaneo, sospensione. **Specie di destinazione**

Canini e gatti. **Indicazioni** - Trattamento delle dermatiti interdigitali, piodermiti, abrasioni, piaghe, ulcere, ragadi, ferite operatorie e traumatiche, infiammazioni cutanee, pruriti di varia eziologia, eczema allergico ed alimentare, orticaria, otite esterna, causate da agenti patogeni sensibili all'amminosidina.

Controindicazioni - Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. I cortisonici topici sono controindicati nei pazienti affetti da malattie virali e micotiche con localizzazione cutanea. Non utilizzare se la membrana timpanica è perforata.

Reazioni avverse - Nessuna conosciuta. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta/foglietto illustrativo, si prega di informare il Veterinario. **Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione** - Il VETERABOL® Spray va nebulizzato per 1-2 secondi

sulla lesione dopo aver deterso la parte eliminando i tessuti necrosati, 1-2 volte al giorno. La nebulizzazione si ottiene premendo sulla valvola e tenendo la bombola a qualche centimetro di distanza dalla parte. Nel caso di ostruzioni, sbloccare la valvola mediante uno specillo da ago per iniezione.

Tempi di attesa - Non pertinente. **Avvertenze speciali** - **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione** - L'assorbimento sistemico di Amminosidina per uso topico

aumenta se vengono trattate aree del corpo estese, specialmente in presenza di danni cutanei o se si utilizzano tecniche di bendaggio occlusivo oppure se si prevede un trattamento per un lungo periodo. In tali situazioni, si possono manifestare gli effetti indesiderati che si evidenziano con l'uso sistemico dell' Amminosidina. L'uso prolungato di antibiotici topici, talvolta consente la proliferazione di organismi non sensibili inclusi i miceti. In questo caso, o qualora si sviluppino irritazione, sensibilizzazione o superinfezione, il trattamento con Veterabol deve essere sospeso e va instaurata una terapia specifica. L'impiego eccessivo o prolungato di corticosteroidi topici può deprimere la funzione ipofisario-surrenalica, provocando iposurrenalismo



spray cutaneo, sospensione, per cani e gatti
Amminosidina,
clostebol acetato,
prednisolone



SOLO PER USO VETERINARIO

secondario e manifestazioni di ipercorticismo. Le otiti batteriche sono spesso di natura secondaria. Le cause sottostanti devono essere identificate e curate. **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali** - Agitare prima dell'uso. L'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità nei confronti dei batteri isolati dagli animali. Se ciò non fosse possibile la terapia dovrebbe essere basata su informazioni epidemiologiche locali circa la sensibilità dei batteri target. L'uso improprio del prodotto potrebbe incrementare la prevalenza di batteri resistenti all'amminosidina e ridurre l'efficacia dei trattamenti con altri antimicrobici a causa della possibile comparsa di cross-resistenza. Prima della applicazione del medicinale veterinario, esaminare attentamente il condotto uditivo esterno per accertarsi che la membrana timpanica non sia perforata, al fine di evitare il rischio di trasmissione dell'infezione all'orecchio medio e per prevenire danni agli apparati cocleare e vestibolare. **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali** Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Non capovolgere durante l'erogazione. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento** - Consentito. **Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione** - Non usare in associazione con sostanze ototossiche. Non miscelare con detergenti nel sito di ap-

plicazione. **Sovradosaggio** - L'amminosidina può avere effetti ototossici se assorbita quando somministrata in dosi superiori al dosaggio autorizzato. **Incompatibilità** - Non note. **Particolari precauzioni per la conservazione** - Recipiente sotto pressione. Proteggere dalla luce solare diretta e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti. Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

A.I.C. n. 101539017
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Ceva Salute Animale S.p.A., Viale Colleoni, 15, 20864 Agrate Brianza (MB).
Responsabile rilascio lotti: **Vetem S.p.A.**, Lungomare Pirandello, 8, 92014 Porto Empedocle (AG).

Data dell'ultima revisione dell'etichetta/foglietto illustrativo - Dicembre 2011.



Veterabol Spray

A101539017



NON DISPENDERE
NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE
DOPO L'USO



N. 608051-N2