

ZONA TIMBRATURA

Lotto n. Da consumarsi preferibilmente entro:




Stabigest®

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

Stabigest®

Mangime complementare liquido per conigli di tutte le razze (conigli nani e conigli in allevamento domestico) e per piccoli mammiferi domestici (criceti, cavia, cincillà, ecc.) in tutte le fasi di età.



Astuccio: PAP 21	Raccolta carta
Flacone: PET 1	Raccolta plastica
Misurino: LDPE 4	Raccolta indifferenziata
Tappo: OTHER 7	Raccolta indifferenziata

Conferire in raccolta l'imballaggio vuoto. Prima dello smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune.



STABIGEST

UFI: 8300-FOPQ-V00C-AH6W



INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Non respirare i vapori. - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. - Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un medico. - Conservare sotto chiave. - Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali.

CONTIENE: acido citrico; acido propionico; acido L-(+)-lattico; acido (2S)-2-idrossipropanoico; solfato di zinco (mono-, hexa- e heptaidrato).

FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano (Italia)
Tel. + 39 02 4345891

www.formevet.com - vetline@formevet.it


Officina di produzione con numero di riconoscimento aIT000539LO

200 ml

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

Stabigest®

Mangime complementare liquido per conigli di tutte le razze (conigli nani e conigli in allevamento domestico) e per piccoli mammiferi domestici (criceti, cavia, cincillà, ecc.) in tutte le fasi di età.



COMPOSIZIONE - Cloruro di potassio, Cloruro di sodio, Saccarosio, Estratto di Propoli (0,1%).

ADDITIVI PER LITRO

Conservanti: 1a270/Acido lattico 280'000 mg - 1k280/Acido propionico 150'000 mg - 1a260/Acido acetico 50'000 mg - 1k236/Acido formico 30'000 mg - 1a330/Acido citrico 25'000 mg - 1a297/Acido fumarico 5'000 mg.

Composti di oligoelementi: 3b605/Solfato di zinco monoidrato 20'000 mg (Zn 7'280 mg) - 3b405/Solfato di rame(II) pentaidrato 9'825 mg (Cu 2'500 mg).

Aromatizzanti: 2b16080/Acido tannico 1'050 mg.

COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI

Proteina grezza 0,9% - Fibra grezza 0,4%
Grassi grezzi 0,8% - Ceneri grezze 4,8%
Sodio 1,02% - Umidità 69,7%.

INDICAZIONI

Per la sua composizione comprendente una miscela di 6 acidi organici a catena corta e media, propoli, composti di oligoelementi, sali minerali ed un astringente (tannino), STABIGEST contribuisce a mantenere l'equilibrio della microflora e del pH intestinale/ciecale in situazioni di stress, quali errori alimentari, sovraffollamento, caldo secco, freddo umido, a salvaguardia di una corretta digestione e del mantenimento in salute dell'animale.

ISTRUZIONI PER L'USO E QUANTITÀ CONSIGLATE

Agitare il flacone prima dell'uso. Usando l'apposito misurino, STABIGEST può essere somministrato, miscelandolo accuratamente, nell'acqua da bere fresca e pulita, in ragione di 3-4 ml per litro, o nel mangime, in ragione di 6-8 ml per ogni chilogrammo. Si consiglia di preparare l'acqua o il mangime giornalmente, sostituendo il residuo. **Rispettare le diluizioni indicate. Non somministrare il prodotto direttamente in bocca all'animale.**

Coniglie fattrici: 4-6 giorni di trattamento durante la 3ª settimana di gestazione.

Conigli in accrescimento: 4-6 giorni di trattamento dopo lo svezzamento, da ripetersi ogni 3-4 settimane.

Conigli nani ed altri piccoli mammiferi domestici da affezione (criceti, cavia, cincillà, ecc.): 4-6 giorni di trattamento ogni 4-5 settimane. Conservare l'astuccio.

AVVERTENZE

Rispettare le diluizioni indicate. Non somministrare il prodotto direttamente in bocca all'animale. L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato. Il prodotto può rimuovere residui calcarei e/o organici nei sistemi di abbeveraggio automatico.

B/0226