

STRIKE®

38 g/100 g

1. Denominazione del medicinale veterinario

STRIKE 38 g/100 g pasta orale per cavalli

2. Composizione

Ogni g di pasta contiene:

Sostanza attiva:

pyrantel pamoato: 0,38 g (equivalenti a pirantel base 0,132g)

Eccipienti:

glicole propilenico 0,048 g

metil-p-idrossibenzoato (E219) 0,002 g

Pasta omogenea di colore giallo

3. Specie di destinazione

Cavallo

4. Indicazioni per l'uso

Trattamento delle infestazioni gastrointestinali sostenute da grandi strongili (*Strongylus vulgaris*, *S. edentatus*, *S. equinus*), piccoli strongili (*Tridontophorus spp.*, *Cyathostominae*) e cestodi (*Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*).

5. Controindicazioni

Non usare in casi di ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno degli eccipienti.

Non usare in animali gravemente debilitati.

6. Avvertenze speciali

L'uso non necessario di antiparassitari o l'uso difforme dalle istruzioni fornite nel RCP possono aumentare la pressione selettiva della resistenza e portare ad una riduzione di efficacia. La decisione di usare il medicinale veterinario deve basarsi sulla conferma della specie parassitaria e della sua carica, o del rischio di infestazione sulla base delle sue caratteristiche epidemiologiche, per ogni singolo animale.

L'uso ripetuto per un periodo prolungato, in particolare quando si utilizza la stessa classe di sostanze, aumenta il rischio di sviluppare resistenza. All'interno di una mandria il mantenimento dei *refugia* sensibili (soggetti che conservano la suscettibilità agli antiparassitari) è essenziale per ridurre tale rischio. Dovrebbero essere evitati sistematicamente trattamenti a cadenza periodica o trattamenti a tutta la mandria. Invece, se possibile, dovrebbero essere trattati solo singoli animali o sottogruppi selezionati (trattamento selettivo mirato). Ciò dovrebbe essere combinato con adeguate misure di allevamento e gestione dei pascoli. Per ogni tipologia di allevamento dovrebbero essere richieste indicazioni specifiche al veterinario responsabile.

L'uso di questo medicinale veterinario deve tenere conto delle informazioni locali sulla sensibilità dei parassiti bersaglio, se disponibili.

Si raccomanda di indagare ulteriormente gli eventuali casi di sospetta resistenza, utilizzando un metodo diagnostico appropriato (ad es. il test di riduzione del conteggio delle uova nelle feci).

Eventuali casi di resistenza confermata devono essere comunicati al titolare dell'A.I.C. o alle autorità competenti.

Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Negli animali debilitati o fortemente infestati, il medicinale veterinario deve essere usato solo dopo un'attenta valutazione del beneficio-rischio da parte del medico veterinario.

Emorragie digestive (diarrea, feci sanguinolente) possono derivare dal trattamento con antelmintici in caso di infestazioni pesanti.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

In caso di ingestione e/o versamento sulla cute rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Indossare guanti di protezione individuale per somministrare il medicinale veterinario.

In caso di contatto accidentale lavarsi le mani accuratamente.

Le persone con nota ipersensibilità al pirantel pamoato devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente

Gravidanza e allattamento

Il medicinale veterinario può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:

Nei soggetti particolarmente debilitati la concomitante somministrazione del medicinale veterinario associata ad altri farmaci colinergici potrebbe accentuare gli effetti nicotinoidi del pirantel potenziandone la sua tossicità.

Non usare contemporaneamente con piperazina, in quanto gli effetti antelmintici del pirantel possono essere contrastati dalla piperazina.

Sovradosaggio:

Non si sono verificati sintomi di alcun genere in seguito a somministrazioni fino a 6 volte superiori alla dose raccomandata per 3 giorni consecutivi.

A dosi superiori a quelli raccomandati è stato registrato un aumento significativo dei valori di ALT.

Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego:

Può svilupparsi resistenza dei parassiti a qualsiasi classe di antelmintici dopo un uso frequente e ripetuto di un antelmintico di quella classe.

Al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti, il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico delle feci.

Per evitare il rischio di sviluppo di resistenza, con conseguente inefficacia della terapia, a causa di un eventuale sottodosaggio, determinare con accuratezza il peso corporeo dell'animale, somministrare correttamente il prodotto ed evitare l'uso troppo frequente e ripetuto per un lungo periodo di tempo di prodotti della stessa classe terapeutica.

Incompatibilità principali:

In assenza di studi sulla compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere somministrato contemporaneamente ad altri medicinali veterinari.

7. Eventi avversi

Cavallo:

Frequenza indeterminata (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)	Anoressia Vomito e diarrea ¹ Sangue nelle feci ¹
---	--

¹possono derivare dal trattamento con antelmintici in caso di infestazioni pesanti

La sostanza attiva non è nota per causare particolari effetti avversi negli animali giovani.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione:

<https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Uso orale.

Infestazioni sostenute da grandi e piccoli strongili

Il dosaggio raccomandato per il trattamento e controllo dei nematodi è di 6,6 mg di pirantel base /kg peso corporeo al giorno, pari a 5 g di pasta orale per 100 kg di peso corporeo, in unica somministrazione.

Infestazioni sostenute da cestodi (TENIE)

Il dosaggio raccomandato per il trattamento e controllo dei cestodi è di 13,2 mg di pirantel base/kg peso corporeo al giorno, pari a 10 g di pasta orale per 100 kg di peso corporeo (dosaggio doppio rispetto a quello consigliato per il trattamento degli strongili).

9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione


Il sottodosaggio potrebbe causare l'inefficacia della terapia e favorire lo sviluppo di resistenza.

Per garantire un dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile.

Utilizzo della siringa da 35 g e da 50 g:

Predisporre la siringa per l'erogazione della dose corretta in base al peso corporeo.

La precisa erogazione della dose da somministrare si ottiene posizionando il margine anteriore della ghiera dello stantuffo in corrispondenza del peso corporeo riportato sulla scala graduata riferita alle infestazioni da strongili o da cestodi (tenie).



10. Tempi di attesa

Carni e frattaglie: zero giorni

11. Precauzioni speciali per la conservazione

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Tenere la siringa ben chiusa e conservare in luogo asciutto. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 30 giorni.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

12. Precauzioni speciali per lo smaltimento

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato.

Chiedere al proprio medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

13. Classificazione dei medicinali veterinari

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni

AIC n° 103942052 - confezione da 1 siringa da 35 g

AIC n° 103942064 - confezione da 20 siringhe da 35 g

AIC n° 103942037 - confezione da 1 siringa da 50 g

15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

04/2026

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione

(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

16. Recapiti

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e recapiti per le segnalazioni di sospette reazioni avverse

ACME srl

via Libero Grassi 9,
IT-42025 Cavriago (RE)

Tel. +39 0522941919

e-mail: farmacovigilanza.acme@acmeanimalcare.com

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

ACME DRUGS srl, via Portella della Ginestra 9/A, 42025 Cavriago (RE)

SKP/PL/s/003


ACME