

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Astuccio esterno, confezione da 5 ml – confezione priva di foglietto illustrativo

Bayticol 6% E.C. 6 g / 100 ml, concentrato per emulsione per bagno per cani

Flumetrina

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Elanco Italia S.p.A.

Via dei Colatori, 12

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel

Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO E SPECIE DI DESTINAZIONE

Bayticol 6% E.C. 6 g / 100 ml, concentrato per emulsione per bagno per cani

Flumetrina.

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DELLE ALTRE SOSTANZE

100 ml di prodotto contengono:

Principio attivo:

Flumetrina 6 g

4. FORMA FARMACEUTICA

Concentrato per emulsione per bagno.

Da utilizzare previa diluizione.

5. CONFEZIONE

Flacone da 5 ml

6. INDICAZIONI

Antiparassitario per uso esterno.

Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da zecche di tutti i tipi e di tutti gli stadi di sviluppo (larve, ninfe, adulti) e infestazioni da pidocchi che parassitano i cani.

7. CONTROINDICAZIONI

Bayticol 6% EC – Var IB unforeseen – MAH transfer to Elanco – Decreto 42 del 03.03.2021

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.
Non usare su cani con lesioni della pelle.
Non usare in caso di ipersensibilità accertata alla flumetrina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

8. REAZIONI AVVERSE

Come per altri piretroidi, possono occasionalmente verificarsi segni transitori di irritabilità della cute e di irrequietezza dell'animale.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta/foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario

9. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

L'emulsione concentrata di **BAYTICOL 6% E.C.**, va diluita con acqua prima dell'uso.
Il rapporto della diluizione va scelto secondo i parassiti da combattere:

ZECHE : 5 ml in ogni 10 litri d'acqua (0,5 ml/l) PIDOCCHI : 10 ml in ogni 10 litri d'acqua (1,0 ml/l)
--

La soluzione va distribuita sulla superficie degli animali con lavaggio, bagno o spugnatura **SENZA RISCIAQUARE**.

Particolare attenzione va rivolta alle parti cutanee sedi di predilezione dei parassiti, come padiglioni auricolari, collo, ascelle, piatto delle cosce e zona perianale.

Possono essere trattati cani di tutte le età, durante la gravidanza e/o l'allattamento, e soggetti in cattivo stato di nutrizione.

E' consigliabile sottoporre al trattamento tutti gli animali conviventi in un gruppo. Nella lotta alle zecche, la ripetizione è necessaria soltanto quando si nota una reinfestazione.

Efficacia contro zecche:

Le zecche adulte e le metaninfe soccombono rapidamente alla normale dose d'uso di 1 mg flumetrina/kg p.v., corrispondente a 5 ml di **BAYTICOL 6% E.C.** per ogni 10 litri d'acqua.

L'efficacia nei confronti delle zecche permane sufficientemente per alcune settimane, dopo una sola applicazione alla concentrazione consigliata.

L'effetto larvicida nei confronti della zecca *Boophilus microplus*, viene già raggiunto al 100% con concentrazioni corrispondenti ad un decimo della normale dose indicata.

Effetto sterilizzante: le femmine dopo l'accoppiamento e il pasto di sangue vengono inibite al 100% nella ovodeposizione già a basse concentrazioni (comprese tra 2 ed 8 mg/l).

Efficacia contro i pidocchi:

Alla concentrazione di 2 mg/kg p.v., pari a 10 ml di **BAYTICOL 6% E.C.** per ogni 10 litri d'acqua, il prodotto è efficace nei confronti dei pidocchi.

spazio per la posologia prescritta, ai sensi del D.Lvo 193/06, art. 58, comma 1, lettera f

10. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il contenitore ben chiuso

Conservare in luogo asciutto, al riparo da fonti di calore, a temperatura non superiore a 25 °C.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta/foglietto illustrativo.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Evitare il contatto del prodotto con muso ed occhi. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Evitare che l'animale ingerisca il prodotto. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

Vedere sezioni 7 – Controindicazioni e 12 – Sovradosaggio.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:

Evitare il contatto con occhi, cute, bocca e indumenti.

Non ingerire.

In caso di versamento accidentale sulla cute, lavare con acqua e sapone. In caso di versamento accidentale negli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Non bere, mangiare o fumare durante l'uso del prodotto.

Gli individui sensibili dovrebbero evitare il contatto con il prodotto.

Usare guanti ed indumenti protettivi adatti.

Non applicare il prodotto in presenza di persone prive di indumenti protettivi.

Durante la diluizione del prodotto si devono indossare guanti protettivi (guanti di protezione in gomma nitrilica monouso) e indumenti protettivi (camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi, scarpe resistenti).

Dopo il trattamento togliersi gli indumenti bagnati, lavare abbondantemente mani, cute esposta e faccia con acqua e sapone.

Non inalare i vapori.

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Non applicare il prodotto controvento.

Non permettere ai bambini di entrare in contatto con animali trattati di recente finché non saranno asciutti.

In caso di ingestione accidentale, indurre il vomito e consultare immediatamente un medico.

Segni di intossicazione sono parestesia, salivazione, tremore, ipercinesia.

Non è noto un antidoto specifico.

In caso di avvelenamento, di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti e mangimi.

Solo per uso veterinario.

Gravidanza e allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Non superare le dosi consigliate.

Il Bayticol 6% E.C. è ottimamente tollerato se utilizzato alle dosi e con le modalità d'uso indicate. I livelli di NOEL calcolati per il cane nelle prove di tossicità a medio termine per esposizione orale, garantiscono l'assenza della comparsa di manifestazioni tossiche preoccupanti anche in seguito all'accidentale ingestione del prodotto per leccamento del mantello da parte degli animali trattati.

I sintomi di intossicazione sistemica sono rappresentati da salivazione, sintomi gastroenterici, tremori, mentre il sovradosaggio topico può causare irritazione (non associata ad infiammazione) che può accompagnarsi a parestesia transitoria.

In caso di ingestione accidentale consultare il medico.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

I medicinali veterinari non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al tuo veterinario o farmacista, come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

Il prodotto è tossico per i pesci, gli organismi acquatici e le api.

Quando si elimina la soluzione di trattamento, evitare di contaminare fiumi, serbatoi, corsi d'acqua, bacini idrici o altre fonti d'acqua.

Non riutilizzare per nessuno scopo il contenitore vuoto.

**14. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI
RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente**

Solo per uso veterinario. (rosso)

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria. (rosso)

15. DATA DI SCADENZA

Scad. {mese/anno}

16. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini

17. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102993134 flacone da 5 ml

18. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n. {numero}

ALTRE INFORMAZIONI

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL TESTO

Marzo 2021

Euro