Figura Bovino
Logo e croce Bayer
Pittogramma forma farmaceutica

ETICHETTA

Bayofly pour-on
(Ciflutrin)
Soluzione all'1% per applicazione pour on
per bovini.

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
BAYER S.p.A.
Viale Certosa, 130
20156 Milano

Fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Bayofly pour-on
per bovini

3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPI(O) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml contengono:
Principio attivo:
Ciflutrin 1,0 g

4. INDICAZIONE(I)

Antiparassitario esterno contro le infestazioni di mosche e tafani (Musca autumnalis, Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Hydrotaea spp., Haematopota spp.) nei bovini comprese le bovine da latte e in gravidanza.

5. CONTROINDICAZIONI

Bayofly® Pour-on non deve essere usato nei vitelli.

6. REAZIONI AVVERSE

Come con altri piretroidi, la somministrazione di Bayofly® Pour-on può essere seguita occasionalmente da segni di irrequietezza, peraltro transitori.
Pertanto i bovini da latte devono essere trattati dopo la mungitura.

Se dovessero manifestarsi effetti gravi o altri effetti non menzionati in questa etichetta, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, comprese le bovine da latte e in gravidanza.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

10 ml per animale (dose contenente 0,1 g di principio attivo).
Bayofly Pour-on è una soluzione pronta per l'uso, da applicare sul mantello, lungo la linea dorsale dell'animale.
Entro poche ore, il Ciflutrin si distribuisce su tutta la superficie dell'animale.
L'effetto abbattente nei confronti dei ditteri è rapido, la maggior parte delle mosche e dei tafani è eliminata dopo 3-4 ore, l'efficacia è massima dopo 12 ore, l'effetto si protrae per 4-6 settimane.
A seconda del grado di infestazione, l'applicazione può essere ripetuta dopo 4-6 settimane.

---

spazio per la posologia prevista

---

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

I bovini da latte vanno trattati dopo la mungitura, poiché occasionalmente l'applicazione può essere seguita da segni di irrequietezza.

10. TEMPO DI ATTESA

Carne: 0 giorni. (rosso)
Latte: 0 giorni. (rosso)

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non conservare al di sotto di 8 °C. e tenere al riparo dalla luce solare.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande e dai recipienti destinati a contenerli.
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Speciali precauzioni per l'impiego negli animali
Può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.
Non applicare contemporaneamente ad altri antiparassitari.
Non superare la dose di 10 ml per animale.
Con Bayofly® Pour-on, come con altri piretroidi, il sovradosaggio può portare a segni transitori di irritazione e agitazione, come colpi di coda e leccamento dei fianchi.
Qualora l'animale ingerisca accidentalmente il prodotto, rivolgersi immediatamente ad un medico veterinario per un trattamento sintomatico.
I segni di intossicazione sono rappresentati da parestesie, salivazione, tremori o ipercinesia.
Non è noto un antidoto specifico.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali
Non ingerire ed evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.
Usare guanti protettivi adatti.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il prodotto medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti da esso derivati, devono essere conferiti negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL TESTO

Maggio 2007

15. CONFEZIONI

- Bottiglia di plastica tipo COEX da 250 ml (A.I.C. n. 102991027)
- Bottiglia di plastica tipo COEX da 500 ml. (A.I.C. n. 102991015)
- Bottiglia di polietilene da 250 ml. (A.I.C. n. 102991054)
- Bottiglia di polietilene da 500 ml. (A.I.C. n. 102991066)

Altre informazioni:

Lotto n.
Scad. (mese/anno)
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Solo per uso veterinario (rosso).
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria (rosso).

Euro:

(esagono con simbolo materiale confezionamento primario)