

Fortecid Acaro Pollino Polvere è una polvere insetticida pronta all'uso che agisce contro gli insetti striscianti, cimici dei letti, pulci, acaro pollino. Il prodotto contiene biossido di silicio (nanomateriale) ed un agente amaricante.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire le istruzioni fornite.

INDICAZIONE PER L'USO

Per un trattamento efficace, identificare il target e seguire le istruzioni specifiche per l'uso.

Per dosare il prodotto, si può utilizzare un cucchiaino monouso o dedicato, considerando che 2,5 g di prodotto equivalgono approssimativamente a 2 cucchiaini.

Rimuovere il prodotto terminato l'effetto residuale. Rimuovere gli insetti morti dopo il trattamento.

Non utilizzare in miscela con altri prodotti chimici.

Per il controllo degli insetti striscianti (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Lasius niger*)

Un attento pre-esame delle aree dove gli insetti passano o si nascondono abitualmente aumenta l'efficacia del trattamento. Prestare particolare attenzione ai luoghi bui e caldi, a scantinati e magazzini, oltre che alle aree intorno a tubi dell'acqua, riscaldamento e ventilazione, sotto gli armadi ed altri oggetti ingombranti.

Per trattamenti all'interno: applicare 5 g/m² di prodotto in strati sottili in crepe e fessure, solo in aree ristrette su superfici dove non è possibile effettuare una pulizia ad umido (es. dietro o sotto gli elettrodomestici, sotto il lavello della cucina) e cavità (divisorio tra pareti, buchi, ecc.) dove solitamente si nascondono gli insetti bersaglio.

Per trattamenti all'esterno attorno agli edifici: applicare 5 g/m² di prodotto in strati sottili in crepe e fessure su superfici pavimentate, solo su balconi e terrazzi.

Per evitare sovradosaggi è fondamentale trattare solo i luoghi dove transitano gli insetti.

Il prodotto ha un forte effetto residuale, 8 settimane contro scarafaggi e 4 settimane contro le formiche.

Per l'uso interno contro lo scarafaggio nero comune e per l'uso interno ed esterno contro le formiche, il prodotto porta a mortalità 7 giorni dopo l'esposizione degli insetti alle superfici trattate, ma non esercita un effetto abbattente.

Applica il prodotto come trattamento barriera per prevenire l'entrata delle formiche all'interno dell'edificio.

Applicare 5 g/m² come trattamento di barriera lungo tutto il perimetro dell'edificio, in una striscia non più larga di 1 cm. Il prodotto esercita una mortalità solo 7 giorni dopo l'esposizione delle formiche a superfici non porose appena trattate, ma non ha né effetto abbattente né residuale.

Campo d'applicazione: all'interno e solo per il controllo delle formiche attorno agli edifici, solo su balconi e terrazzi.

Frequenza di applicazione: il trattamento può essere eseguito fino a due volte all'anno.



FORTECID® ACARO POLLINO POLVERE



**INSETTICIDA IN POLVERE PRONTO ALL'USO
PER L'UTILIZZATORE NON PROFESSIONALE
CONTRO ACARO POLLINO, PULCI, BLATTE,
FORMICHE E CIMICI DEI LETTI**

Per il controllo di cimici dei letti e pulci (*Cimex lectularius*, *Ctenocephalides felis*)

Le cimici dei letti si annidano in aree molto ristrette nelle fessure dei muri, nelle giunture dei mobili, dietro i quadri e nelle cuciture degli arredi. Questi insetti generalmente rimangono in queste aree, che abbandonano solo per nutrirsi durante la notte. Durante il giorno o quando le luci sono accese le cimici dei letti di solito non si vedono fuori dal nido.

Le pulci si annidano nelle crepe e fessure dei pavimenti, o nelle fessure di mobili e arredi.

Applicare 10 g/m² di prodotto in strati sottili in crepe e fessure solo su aree ristrette, su superfici che normalmente non vengono pulite ad umido (sotto i mobili, negli angoli e in altri nascondigli) e in cavità (divisorio tra pareti, buchi, ecc.), dove gli insetti solitamente si nascondono.

Il prodotto è efficace fino a 2 settimane.

Campo d'applicazione: all'interno degli edifici.

Frequenza di applicazione: il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

Per il controllo del pidocchio pollino (*Dermanyssus gallinae*)

L'acaro del pollo (o acaro rosso) è un parassita che si nutre del sangue del pollo generalmente durante la notte. Durante il giorno questi acari possono nascondersi in diverse zone del pollaio, come nelle crepe, fessure, fori e cavità delle strutture in legno circostanti. Pulire il pollaio prima del trattamento e applicare 10 g/m² di insetticida. Applicare il prodotto in crepe e fessure dove gli acari potrebbero nascondersi.

L'efficacia è prevista 1 settimana dopo l'applicazione.

Attività residuale: 2 settimane.

Campo d'applicazione: uso all'interno in strutture avicole non collegate a STP, nelle seguenti sottocategorie di stabulazione:

- Galline ovaiole, gabbie in batteria senza trattamento,
- Galline ovaiole, gabbie in batteria con essiccazione forzata,
- Galline ovaiole, gabbie in batteria compatte,
- Galline ovaiole, ruspani su pavimento grigliato,
- Parent broiler >18 settimane, ruspani su pavimento grigliato,
- Parent broiler in allevamento, ruspani su pavimento grigliato.

Frequenza di applicazione: il trattamento può essere eseguito fino a 4 volte l'anno con un intervallo di 91 giorni tra un'applicazione e l'altra.

Precauzioni ambientali: impedire l'immissione del prodotto nell'ambiente (acque superficiali e sotterranee), fognature, scarichi ecc. con la realizzazione di barriere protettive e chiusura di scarichi. Informare le autorità competenti su perdite o sversamenti incontrollati in corsi d'acqua, scarichi, fognature.

Non utilizzare in strutture per animali in cui non sia possibile evitare l'esposizione a impianti di trattamento delle acque reflue (STP) o l'emissione diretta nelle acque superficiali.

Il prodotto va applicato lontano dagli animali; non applicare direttamente sugli animali.

FORTECID® ACARO POLLINO POLVERE
Insetticida in polvere pronto all'uso (PT18)
Per l'utilizzatore non professionale

FORTECID® ACARO POLLINO POLVERE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina pura (CAS N. 52315-07-8) 0,6 g

Co-formulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONE DI PERICOLO:

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRODOTTI BIOCIDATI (PT18) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2023/00936/MRP

Titolare dell'Autorizzazione:

Vebi Istituto Biochimico SRL - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) - Tel. +39 049 9337111 - www.vebi.it

Officina di Produzione:

ABIOTECH INSTITUTE SRL - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Distribuito da:

Formevet S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Tel. + 39 02 4345891 - vetline@formevet.it

Contenuto: 1000 g

Lotto n./del: vedi timbro sul fondo della busta

Validità: 3 anni dalla data di produzione, conservato nella confezione originale integra, al riparo dalla luce e dall'esposizione ai raggi solari, a temperatura ambiente.



ATTENZIONE

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Se l'infestazione persiste, contattare un professionista.

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali non bersaglio.

Per evitare resistenze, conservare le istruzioni sull'etichetta ed evitare l'uso ripetuto di prodotti contenenti Cipermetrina, alternandoli a prodotti contenenti principi attivi con meccanismo d'azione e gruppo diversi.

Non applicare il prodotto su superfici che potrebbero entrare in contatto con animali, cibo o bevande intese per consumo umano o per mangimi di bestiame.

Per l'uso interno, il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette, su superfici in cui una pulitura ad umido non è praticabile. Non applicare su aree soggette alla normale pulitura ad umido.

Per trattamenti attorno agli edifici: applicare solo su superfici pavimentate e aree coperte da tetti. Non applicare in prossimità di corpi idrici superficiali o di zone di protezione delle acque.

Applicare solo in aree non soggette a sommersione o ad essere bagnate, quindi al riparo da pioggia, inondazioni e acque di pulizia.

Da usare solo in aree inaccessibili a neonati, bambini e animali non bersaglio.

Non mettere in atto procedure di pulitura ad umido, ma solo procedure di pulitura a secco (aspirapolvere o scopa) oppure usare carta umida. Dopo la pulizia, smaltire quanto raccolto come rifiuti solidi.

MISURE DI PRONTO SOCCORSO E ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO

Se è necessario un consiglio del medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Il prodotto contiene Cipermetrina: potrebbe provocare parestesia.

IN CASO DI ESPOSIZIONE: in caso di malessere, consultare un medico o un centro antiveleni.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: in caso di malessere, consultare un medico o un centro antiveleni.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un medico o un centro antiveleni.

IN CASO DI INALAZIONE: in caso di malessere, consultare un medico o un centro antiveleni.

IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, consultare un medico o un centro antiveleni.

Non esiste un antidoto, si consiglia un trattamento sintomatico.

Non sono previsti effetti avversi se si seguono le istruzioni per l'uso.

Raccogliere e smaltire il prodotto senza creare nuvole di polvere. Raccogliere le fuoriuscite e metterle in contenitori idonei ben sigillati per lo smaltimento. Pulire le superfici contaminate con carta umida e dopo la pulizia smaltirla nei rifiuti solidi.

Smaltire rifiuti e residui in accordo con i requisiti delle autorità locali. Non consentire il deflusso negli scarichi, nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Busta: Plastica O 7 - Raccolta differenziata.
Il prodotto contiene un pesticida.
Verifica le disposizioni del tuo Comune prima dello smaltimento.



A/0126
9804633 - 03/2026

