

SOLO PER USO VETERINARIO - 4 bustine da g 12  
Polvere orale per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (Pyrantel)

# ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g

## ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g



**Polvere orale per cavalli  
non destinati alla produzione  
di alimenti per il consumo umano  
(Pyrantel)**

SOLO PER USO VETERINARIO - 4 bustine da g 12

**Candioli**  
FARMACEUTICI

### INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE:

1 g di polvere contiene: **Principio attivo:** Pyrantel mg 168,33 (equivalenti a mg 485,417 di Pyrantel pamoato)

**Eccipienti:** Lattosio mg 514,583

**FORMA FARMACEUTICA:** Polvere orale.

**CONFEZIONE:** astuccio contenente 4 bustine da g 12

**SPECIE DI DESTINAZIONE:** Cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

**INDICAZIONI:** Indicato nel trattamento delle parassitosi intestinali dei cavalli, non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, sostenute da grandi e piccoli Strongili (*Strongylus Vulgaris*, *S. Equinus*, *Trichonema* spp., *Triodontophorus* spp.), Ascaridi (*Parascaris equorum*), Ossiuri (*Oxyuris equis*) e Cestodi (*Anoplocephala perfoliata*).

**MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:** Il prodotto va somministrato per via orale, mescolandolo alla consueta razione alimentare e controllando che venga completamente consumata. Utilizzare la confezione più adatta alle esigenze del trattamento da effettuare.

Somministrare in ragione di mg 40 di prodotto (pari a mg 6,733 di principio attivo) per kg di peso vivo dell'animale.

Per puledri di età compresa tra due e otto mesi, si effettua una somministrazione ogni 4-6 settimane.

Nei cavalli adulti, si effettua una somministrazione 3-4 giorni prima della messa al pascolo.

In condizioni di rischio, somministrare ogni 4 settimane.

Nelle fattrici, somministrare 1-2 settimane prima del parto, quindi ripetere 1-2 settimane dopo il parto, successivamente, ogni 6-8 settimane.

In caso di infestazioni sostenute da cestodi (vermi piatti), le dosi andranno raddoppiate: in caso di infestazioni particolarmente gravi, ripetere il trattamento dopo 20 giorni

**TEMPO DI ATTESA:** Non pertinente.

**Uso non consentito in cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.**

**AVVERTENZE SPECIALI:** Prima dell'uso, leggere il foglietto illustrativo contenuto nella confezione.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE:** Conservare in luogo asciutto, a temperatura non superiore a 25°C, al riparo dalla luce.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**Solo per uso veterinario**

**TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.**

A.I.C. n. 102168010 - Astuccio da 4 bustine da g 12

**MEDICINALE VETERINARIO SENZA OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA.**

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo l'apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.



**Candioli**  
FARMACEUTICI

**NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C. S.p.A.-  
Via A. Manzoni, 2 - BEINASCO (TO)

**RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36  
BRESCIA

C0104V1

Lotto N.

Scad.



102168010