



ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g



**Polvere orale per cavalli
non destinati alla produzione
di alimenti per il consumo umano
(Pyrantel)**

SOLO PER USO VETERINARIO - 40 bustine da g 12



ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g



**Polvere orale per cavalli
(Pyrantel)**

SOLO PER USO VETERINARIO - 40 bustine da g 12



**NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO**
Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli &
C. S.p.A. - Via A. Manzoni, 2 - BEINASCIO (TO)

**RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE E
RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**
Unione Commerciale Lombarda S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 36 - BRESCIA



C0407V1



ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g



**Polvere orale per cavalli
non destinati alla produzione
di alimenti per il consumo umano
(Pyrantel)**

SOLO PER USO VETERINARIO - 40 bustine da g 12



ANTIELMINTICO CANDIOLI 168,33 mg/g



**Polvere orale per cavalli
(Pyrantel)**

SOLO PER USO VETERINARIO - 40 bustine da g 12

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE:
1 g di polvere contiene: Principio attivo: Pyrantel mg 168,33
(equivalenti a mg 485,417 di Pyrantel pamoato)
Eccipienti: Lattosio mg 514,583

FORMA FARMACEUTICA: Polvere orale.

CONFEZIONE: astuccio contenente 40 bustine da g 12

SPECIE DI DESTINAZIONE: Cavalli non destinati alla
produzione di alimenti per il consumo umano.

INDICAZIONI: Indicato nel trattamento delle parassitosi
intestinali dei cavalli, non destinati alla produzione di
alimenti per il consumo umano, sostenute da grandi e
piccoli Strongili (*Strongylus Vulgaris*, *S. Equinus*,
Trichostrongylus axei, *Triodontophorus* spp.), Ascaridi
(*Parascaris equorum*), Ossuari (*Oxyuris equi*) e Cestodi
(*Avitropocaula perfoliata*).

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: Il prodotto va
sommministrato per via orale, mescolandolo alla consueta
razione alimentare e controllando che venga completamente
consumata. Utilizzare la confezione più adatta alle esigenze
del trattamento da effettuare.

Sommministrare in ragione di mg 40 di prodotto (pari a mg
6,733 di principio attivo) per kg di peso vivo dell'animale.
Per puledri di età compresa tra due e otto mesi, si effettua
una somministrazione ogni 4-6 settimane.

Nei cavalli adulti, si effettua una somministrazione 3-4 giorni
prima della messa al pascolo.

In condizioni di rischio, somministrare ogni 4 settimane.

Nelle fattrici, somministrare 1-2 settimane prima del parto,
quindi ripetere 1-2 settimane dopo il parto, successivamente,
ogni 6-8 settimane.

In caso di infestazioni sostenute da cestodi (vermi piatti), le
dosi andranno raddoppiate: in caso di infestazioni
particolarmente gravi, ripetere il trattamento dopo 20 giorni.

TEMPO DI ATTESA: Non pertinente.

**Uso non consentito in cavalli destinati alla produzione
di alimenti per il consumo umano.**

AVVERTENZE SPECIALI: Prima dell'uso, leggere il foglietto
illustrativo contenuto nella confezione.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE:
Conservare in luogo asciutto, a temperatura non superiore
a 25°C, al riparo dalla luce.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO
SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI
RIFIUTI:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti
derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in
conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli
idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i
medicinali non utilizzati o scaduti.

Solo per uso veterinario

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

A.I.C. n. 102168022 - Astuccio da 40 bustine da g 12

**MEDICINALE VETERINARIO SENZA OBBLIGO DI RICETTA
MEDICO VETERINARIA.**

La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato.

Dopo l'apertura il prodotto deve essere consumato
immediatamente e non conservato.

Lotto, N.

Scad.