

Calf Lyte® PLUS

COMPOSITION / COMPOSIZIONE:

Dextrose / Destrosio	60.5%
Sodium acetate / Sodio acetato	18.3%

Sodium chloride, potassium chloride, monosodium phosphate, dipotassium phosphate, milk protein powder (including lactoferrin 0.1%), caramelized sugar. Carbohydrate source: Dextrose.

Cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato monosodico, fosfato dipotassico, proteina del latte in polvere (comprendente lattoferrina 0.1%), zucchero caramellato. Fonte di carboidrati: Destrosio.

ANALYTICAL CONSTITUENTS / COSTITUENTI ANALITICI:

Total sugars / Zuccheri totali	60.5%
Crude ash / Ceneri grezze	17.7%
Crude protein / Proteina grezza	12.0%
Sodium / Sodio	5.9%
Chlorides / Cloruri	2.8%
Potassium / Potassio	1.7%
Crude fat / Oli e grassi grezzi	0.5%
Crude fibre / Fibra grezza	0.5%

ADDITIVES / ADDITIVI:

Flavours: Glycine (2b17034) 90400 mg/kg

Aromi: Glicina (2b17034) 90400 mg/kg

ENERGY VALUE / VALORE ENERGETICO: 326 kcal/100g

Storage conditions: Store in tightly closed containers, in a dry place in temperature below 25°C.

Keep out of sight and reach of children.

Conservazione: Conservare in contenitori ben chiusi, in ambiente asciutto con temperatura inferiore a 25°C.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Distributed by / Distribuito da:

Vetoquinol UK Limited, Pury Hill Business Park, Towcester, Northants, NN12 7LS
www.vetoquinol.co.uk

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265, 47032 Bertinoro (FC) Italy
www.vetoquinol.it

Riconoscimento n°: clT000026FC

Manufactured by / Prodotto da:

Vetoquinol N.-A. inc., 700 St-Henri, Princeville, Canada G6L 4X1

CA - Agreement num./Riconoscimento n°: DP-01

Importer/Importatore: a-FR-70-321-001

USAGE / USO:

CALF-LYTE® PLUS is for use in calves in case of risk of, during periods of, or recovery from digestive disturbance (diarrhoea).

The combination of sodium acetate, electrolytes and dextrose is a hypertonic (490 mOsm/l) dietetic complementary feed for calves with digestive disturbance (diarrhoea).

Once reconstituted the solution does not interfere with milk digestion and can be given to suckling calves and to calves that are being hand fed milk.

CALF-LYTE® PLUS è da usare in caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.

Per la combinazione di sodio acetato, elettroliti e destrosio è un mangime complementare dietetico ipertonico (490 mOsm/l), destinato a vitelli con disturbi digestivi (diarrea).

Una volta ricostituita, la soluzione non interferisce con la digestione del latte e può essere somministrata a vitelli allattati sia naturalmente, sia artificialmente.

ADMINISTRATION / MODALITÀ D'USO:

Calves / Vitelli:

Dissolve 1 pouch (90g) in 2 litres of warm water (37°C) and administer by bottle or stomach tube.

Administer 2 litres of the fresh solution 2 to 3 times daily, exclusively or with normal diet (milk or milk replacer).

Sciogliere 1 busta (90 g) in 2 litri di acqua tiepida (37°C) e somministrare la soluzione con biberon o sonda gastrica.

Fornire 2 litri di soluzione fresca da 2 a 3 volte al giorno, come unico alimento, oppure insieme all'alimento normale (latte o sostitutivo del latte).

PERIOD OF USE / PERIODO D'USO:

1 to 7 days if fed with normal diet.

1 to 3 days if fed exclusively, followed by a 1 day transition to normal diet and CALF-LYTE® PLUS.

Da 1 a 7 giorni se fornito insieme alla dieta normale.

Da 1 a 3 giorni se usato come alimento unico, seguito da 1 giorno di transizione in cui associare dieta normale e CALF-LYTE® PLUS.

*It is recommended that advice from a veterinarian be sought before use and before extending the period of use.
Do not dissolve a pouch in less than 2 litres of water.*

Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo di impiego. Non sciogliere una busta in meno di 2 litri d'acqua.

