

Equitop Pronutrin[®]

Mangime complementare dietetico per la riduzione delle reazioni da stress nei cavalli.

Confezione:

Barattolo da 3,5 kg.

Equitop Pronutrin[®] fornisce un supporto nutrizionale ai cavalli con sintomi di reazioni da stress a livello gastrico, quali: scarso appetito, basse prestazioni, perdita dell'appetito, perdita di peso, depressione generale, digrignamento dei denti, coliche, aumento della salivazione e ticchio di appoggio.

Equitop Pronutrin[®] può essere somministrato ai cavalli prima o durante una partecipazione ad eventi sportivi. Non contiene sostanze ad effetto dopante.

Equitop Pronutrin[®] contiene il 77% di Apolectol[®], una miscela brevettata di fibre derivate da frutta e vegetali, glicerolo e lecitina.

Composizione:

Polpa di frutta e verdura disidratata, zucchero, succo di mela disidratato, glicerolo.

Additivi:

Lecitina.

Utilizzo:

Equitop Pronutrin[®] può essere somministrato a complemento della normale alimentazione: prima o durante periodi in cui sono richieste alte prestazioni; prima o durante periodi in cui sono somministrate elevate quantità di mangimi concentrati; prima o durante il cambio di alimentazione; quando il consumo di alimento è ridotto o il cavallo rifiuta di alimentarsi; prima del trasporto; prima o durante lo svezzamento dei puledri; durante situazioni conflittuali all'interno del gruppo; prima di interventi chirurgici; in altre situazioni in cui sia necessario un maggiore apporto di nutrienti per supportare la mucosa gastrica.

Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto in nutrizione o di un medico veterinario prima dell'uso o prima di prolungare il periodo di impiego.

Somministrare una dose giornaliera di 50 g di Equitop Pronutrin[®] per 100 kg di peso corporeo per 2-4 settimane. Questo regime di somministrazione può essere ripetuto se necessario.

Il dosatore incluso nella confezione contiene 50 g di mangime. Una confezione è sufficiente per il trattamento di un cavallo di taglia media per un periodo di 14 giorni.

Cavalli da corsa: La dose giornaliera di Equitop Pronutrin[®] deve essere somministrata prima della gara o dell'allenamento.

Altri cavalli adulti: La dose giornaliera di Equitop Pronutrin[®] deve essere miscelata con l'usuale razione di cereali o mangimi concentrati e suddivisa in parti uguali tra i pasti giornalieri.

Ad esempio: se il cavallo è alimentato due volte al giorno, miscelare metà della quantità giornaliera raccomandata di Equitop Pronutrin[®] nella razione del mattino e la seconda metà nella razione della sera.

Se il cavallo rifiuta di assumere Equitop Pronutrin[®], iniziare con metà della dose giornaliera raccomandata ed aumentare progressivamente i dosaggi nei successivi 2-3 giorni fino al raggiungimento della dose giornaliera completa.

Puledri: Per puledri ancora allattati la dose raccomandata di Equitop Pronutrin[®] deve essere miscelata con una quantità pari a 3 volte di acqua tiepida, lasciando sciogliere il mangime per 2-3 minuti. Quindi somministrare direttamente nella bocca dell'animale utilizzando una siringa o un biberon.

Analisi garantita:

Proteina grezza 5,7%

Oli e grassi grezzi 10,0%

Ceneri grezze 2,7%

Cellulosa grezza 13,5%

Magnesio 0,2%

Sodio 0,1%

Conservare in luogo asciutto a temperatura inferiore ai 25°C.

Distributore

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Via Lorenzini 8 - 20139 Milano

www.boehringer-ingelheim.it

Prodotto da

Boehringer Ingelheim Denmark A/S

DK-2100 Copenhagen OE

Numero di registrazione: 208-R854833

Equitop[®] e Pronutrin[®] sono marchi registrati di Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilizzati su